

Gastro-enterologie

Een behandeling met Mirikizumab (Omvoh®)



Wat is Mirikizumab?

Mirikizumab (Omvoh®) is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt. Het valt onder de categorie **biologicals** of **immunosuppressiva**. Deze geneesmiddelen kunnen de ziekte verbeteren door een deel van het immuunsysteem te onderdrukken.

Mirikizumab is een selectieve IL-23 remmer geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, die onvoldoende reageren op conventionele behandeling of andere biologische therapieën. De werking treedt meestal na enkele weken op, maar soms duurt het langer. Helaas kan het medicijn bij sommige mensen onvoldoende of helemaal niet werken.

Opstarten en dosis

Omdat Mirikizumab wordt voorgeschreven wanneer andere behandelingen onvoldoende werken, ben je vooraf al gescreend op actieve of inactieve tuberculose. De behandeling start via een infuus in het dagziekenhuis.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze IBD-verpleegkundigen. Ze zijn er om jou te helpen!

Hoe ziet het behandelingsschema eruit?

De inductiefase (startfase):

- de inductiefase bestaat uit 3 infusen met telkens 4 weken ertussen (week 0, week 4, week 8)
- **colitis ulcerosa:** elke dosis wordt over 30 minuten toegediend en er wordt 30-60 minuten nagespoeld
- **ziekte van Crohn:** elke dosis wordt over 90 minuten toegediend en er wordt 30-60 minuten nagespoeld
- bij elk infuus wordt een bloedafname gedaan voor controle leverenzymen en bilirubine

Colitis ulcerosa

Op week 10 word je ingepland voor een li-colonoscopie (onderzoek van de linkerzijde van de dikke darm).

Na dit onderzoek bespreekt de arts met jou of extra infusen nodig zijn om de behandeling verder op te bouwen. Dit noemen we een **verlengde startfase** (of verlengde inductie).

- Bij een verlengde startfase krijg je nog 3 infusen, telkens met 4 weken ertussen: week 12, 16 en 20.
- Op week 22 wordt opnieuw een li-colonoscopie gepland om te zien hoe goed de behandeling werkt.

Ziekte van Crohn

Op week 10 heb je een consultatie en wordt de opstart onderhoudstherapie met SC-injecties gepland voor week 12.

De onderhoudsfase:

- 4 weken na je laatste infuus (week 8 of week 20) start je met de onderhoudse toedieningen
- **colitis ulcerosa:** telkens 2 pennen van 100 mg of 1 pen van 200 mg
- **ziekte van Crohn:** telkens 1 pen van 200 mg en 1 pen van 100 mg
- de IBD-verpleegkundige leert je hoe je deze injecties zelf thuis kunt geven
- hierna zet je de therapie zelfstandig thuis voort
- de injecties moeten om de 4 weken worden toegediend

Wat doe je bij een gemiste dosis?

Als je een dosis mist, moet deze **zo snel mogelijk worden toegediend**. Daarna hervat je de normale dosering volgens de planning.

Bewaren van Mirikizumab

Bewaar de medicatie in de **koelkast**. Haal ze 30-45 minuten voor gebruik uit de koelkast.

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens of direct na het infuus kunnen zeldzame bijwerkingen optreden:

- hoofd- of spierpijn
- duizeligheid of lage bloeddruk
- moeite met ademen of slikken

- uitslag
- gezwollen gelaat, lippen, mond of keel

De meest voorkomende bijwerking zijn infecties van de bovenste luchtwegen.

Als je je onwel voelt tijdens het infuus, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige. Dit kan wijzen op een allergische reactie.

Vaccinaties

Tijdens de behandeling met Mirikizumab mag je geen levende vaccins ontvangen. Bespreek dit met je behandelend arts of IBD-verpleegkundige.

Zwangerschap

Wil je zwanger worden of ben je (onverwacht) zwanger? Bespreek dan het medicatiebeleid met je behandelend arts.

Praktische informatie

Jouw eerste IV-toediening vindt plaats / / om uur. Neem contact op indien je niet aanwezig kan zijn.

Je hoeft **niet nuchter** te zijn.

Tijdens de eerste behandeling krijg je uitleg over de verdere therapie en alle tools om thuis verder te behandelen. Normaal gesproken kan je na het infuus zelfstandig naar huis.

Contact

campus Bornem

IBD-verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle
03 890 59 27 | route 40
veroniek.vandewalle@azr.be

IBD-artsen

dr. Michiel Schils
dr. Gaetan Van den Steen

Dagziekenhuis geneeskunde
campus Bornem: 03 890 17 43

campus Rumst

IBD-verpleegkundig consulente

Valerie Rosiers en Inne Rijmenans
03 880 91 70 | route 77c
ibd.rumst@azr.be

IBD-artsen

dr. Ludwig Marchal
dr. Geert Van de Vyver

Dagziekenhuis geneeskunde
campus Rumst: 03 880 99 90

ref.: 50121253

versie: 22/01/2026

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Veroniek Vandewalle, gastro-enterologie campus Bornem
v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be