

Annex B Hoe nasofaryngeale stalen nemen?

- Breng een eerste wattenstaafje diep in het neusgat (tot in de nasofarynx: ongeveer tot de helft van de lengte van de neus tot het oor) en maak zoveel mogelijk cellen los door langs de binnenkant van een neusgat te schrapen.
- Plaats het wattenstaafje in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
- Indien mogelijk en/of toepasselijk, ga met een tweede wattenstaafje op dezelfde manier te werk om een staal te nemen van de ontstoken zones in de keel (amandelen, keelwand, etc.). Plaats het wattenstaafje in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
- Sluit het flesje hermetisch.
- Het staal identificeren:
 - Referentie van de patiënt;
 - Datum van staalname;
 - Arts: Coördinaten van de behandelende arts die het staal heeft afgenomen.
- In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C)
- Voeg het NRC aanvraagformulier toe bij verzending.



(Relatieve) contra-indicaties:


- Ziekte van Rendu-Osler-Weber
- Ernstige thrombopenie ($< 15 \cdot 10^9/L$)
- Recente neus cauterisatie en/of chirurgie

Consulteer de behandelende arts bij twijfel

STOP tijdens de procedure en probeer via ander neusgat indien: weerstand bij het inbrengen van de Swab of pijn bij de patiënt




3 Draai de Swab minimaal 3 maal rond om voldoende materiaal op te nemen



1 Buig het **hoofd lichtjes naar achteren** en breng de Swab in. Druk de Swab lichtjes tegen het onderste gedeelte van de neus aan.



2 Breng de Swab tot in de nasofarynx. Dit is **ongeveer de helft van de lengte van de neus tot het oor**.



4 Verwijder de Swab uit de neusholte.



5 Breek de Swab af in de bijhorende tube ter hoogte van de rode lijn. Sluit de tube en breng de **patiëntgegevens** aan op de tube.