

IBD (inflammatoire darmziekten)

Een behandeling met Ustekinumab (Stelara®)



Wat is Ustekinumab?

Ustekinumab (Stelara®) is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt en daarom wordt voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn. Het behoort tot de groep geneesmiddelen onder de noemer "immunosuppressiva": deze geneesmiddelen zorgen voor een goede werking door een deel van het afweersysteem te verzwakken.

Ustekinumab is een monoklonaal anti-lichaam: dit zijn eiwitten die specifiek bepaalde eiwitten in het lichaam herkennen en zich eraan binden.

Opstarten dosis

Voor een behandeling met Ustekinumab kan worden opgestart, screenen we eerst op actieve of inactieve tuberculose. Deze screening gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en een bloedafname. Er wordt daarnaast navraag gedaan of je een latexallergie hebt.

Ustekinumab wordt in eerste fase toegediend via een infuus. Nadien wordt de behandeling verdergezet met een subcutane (onderhuidse) injectie om de 8 of 12 weken (onderhoudsbehandeling).

Voor de toediening met Ustekinumab moet je een aantal controlevragen beantwoorden:

- 1/ Ben je onlangs ziek geweest of heb je op dit moment griepklachten of een verkoudheid?
 - Neen
 - ja. Zo ja, heb je koorts (>38.5°C)?
 - neen
 - ja

- 2/ Zijn er sinds de vorige toediening nog veranderingen geweest in je medicijngebruik?
 - neen
 - ja. Zo ja, wat is er veranderd?
 -

- 3/ Heb je minder dan 2 weken geleden een vaccinatie gehad of verwacht je dat je de komende 4 maanden nog gevaccineerd gaat worden tegen gele koorts en/of bof/mazelen/rode hond (BMR-vaccin)?
 - neen
 - ja

- 4/ Onderga je binnenkort een operatie?
 - neen
 - ja

Indien JA wordt geantwoord op 1 van deze vragen, dan mag Ustekinumab niet worden opgestart en moet je eerst jouw behandelend arts raadplegen.

Mogelijke nevenwerkingen

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en spierpijn, duizeligheid en lage bloeddruk, moeite met ademen of slikken, uitslag, gezwollen gelaat, lippen, mond of keel. Verwittig onmiddellijk de verpleegkundige wanneer je je onwel voelt tijdens de toediening. Dit wijst op een allergische reactie.

Bij gebruik van Ustekinumab kan je lichaam minder weerstand bieden tegen infecties. Raadpleeg je arts als je één van volgende symptomen opmerkt:

- koorts
- griepachtige symptomen
- zweetaanvallen 's nachts
- vermoeidheid
- kortademigheid
- een hoest die niet overgaat
- een warme, rode, pijnlijke huid of een pijnlijke huiduitslag met blaren
- een brandend gevoel bij het plassen
- diarree

Zeldzaam (max 1/1000 pers) maar ernstige huidaandoening is een erythrodermische psoriasis of explosieve dermatitis = vervelling van de huid, verergering van roodheid en vervelling van de huid over een groter gebied van de huid kunnen symptomen zijn. Waarschuw onmiddellijk uw arts.

De beschermdop over de naald van de voorgevormde spuit is vervaardigd uit latex, wat allergische reacties kan veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor latex.



Zwangerschap

Wens je zwanger te worden of ben je reeds (al dan niet onverwacht) zwanger, dan is het aanbevolen het medicatiebeleid te bespreken met jouw behandelend arts.

Neem contact op met de afdeling wanneer je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

Praktische info

De eerste toediening is gepland op
..... om uur op het

0 **dagziekenhuis geneeskunde**
(campus Bornem, route 150)

0 **dagziekenhuis campus Willebroek**

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij jouw arts dit heeft gevraagd. Tijdens de infusie-behandeling mag je de infuuseenheid niet verlaten. Breng gerust iets mee om te lezen of te werken. Je kan ook wat rusten of praten met de andere patiënten.

Draag best comfortabele kledij. In normale omstandigheden kan je na de behandeling zelf naar huis rijden.

Contact

Dagziekenhuis campus Bornem

03 890 17 43. Alle werkdagen tussen 08:00u en 18:00u.

Dagziekenhuis campus Willebroek

03 860 32 43. Alle werkdagen tussen 07:00u en 18:00u.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de IBD verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle

03 890 59 27

veroniek.vandewalle@azr.be

DIENST IBD



dr. P. Potvin



dr. G. Van den Steen



Veroniek Vandewalle

IBD-verpleegkundig consulente,
Veroniek.vandewalle@azr.be

03 890 59 27

**IBD-CENTRUM
CAMPUS BORNEM**

Dr. P. Potvin - Dr. G. Van den Steen

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

ref.: 50006237

versie: 09/07/2019

foto's & illustraties: Adobe stock, shutterstock

eigenaar: dr. P. Potvin, diensthoofd maag-, darm- en leverziekten
& Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

