

Medische beeldvorming

Hysterosalpingografie (HSG)



Hystero- salpingografie (HSG)

Welkom op de dienst medische beeldvorming van AZ Rivierenland. Je bent hier voor een hysterosalpingografie, kortweg een hystero of HSG. Dit is een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders met behulp van contraststof.

Graag geven wij je in deze brochure iets meer uitleg. Heb je na het lezen nog vragen, stel deze gerust aan de arts of de verpleegkundige. Zij zijn altijd bereid je vragen te beantwoorden.

Wat is een hystero- salpingografie?

Bij dit radiologisch onderzoek worden de baarmoeder en de eileiders zichtbaar gemaakt door middel van contrastvloeistof. Met behulp van röntgenstralen verschijnen er beelden op het scherm.

Via dit onderzoek sporen we eventuele afwijkingen van de baarmoeder op en bekijken we de doorgankelijkheid van de eileider. Meestal gebeurt dit onderzoek bij het in kaart brengen van vruchtbaarheidsproblemen.

Belangrijk

- * Het onderzoek moet bij voorkeur tussen 6 en 9 dagen na de eerste dag van je menstruatie gebeuren.
- * Ben je mogelijk zwanger? Meld dit dan zeker aan de verpleegkundige!
- * Neem je anticoagulantia (antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan de verpleegkundige!
- * Ben je allergisch voor jodiumhoudende contrastvloeistoffen? Verwittig dan vooraf de dienst!

Campus Bornem: 03 890 16 61

maandag – vrijdag: 08.00u – 18.00u
zaterdag: 09.00u – 11.00u

Campus Willebroek: 03 860 32 34

maandag – vrijdag: 08.30u – 17.00u

Campus Rumst: 03 880 95 25

maandag – vrijdag: 07.00u – 21.00u
zaterdag: 08.00 – 13.00u

Hoe zal het onderzoek verlopen?

Wees tijdig aanwezig voor je afspraak en meld je aan bij de balie van de dienst medische beeldvorming. De verpleegkundige komt je zo snel mogelijk halen in de wachtzaal. Je krijgt een onderzoekschortje: houd enkel dit schortje aan tijdens het onderzoek. Je gaat vervolgens op de onderzoekstafel liggen.

Allereerst worden er enkele overzichtsopnames gemaakt. Vervolgens brengt je gynaecoloog met behulp van een speculum (eendenbek) een fijne katheter in de baarmoeder. Zo wordt er contrastvloei-stof ingespoten en beelden gemaakt. Het inspuiten van de vloeistof kan pijnlijk zijn, wat het onderzoek weinig aangenaam maakt.

Toch is het een eenvoudig onderzoek met weinig risico's. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Je krijgt na het onderzoek een washandje en een handdoek om je op te frissen. Je krijgt ook een maandverband om eventueel bloedverlies en contrastvloei-stof op te vangen. Wat bloedverlies is normaal. Duurt dit langer dan 3 dagen, neem dan contact op met de gynaecoloog. Het onderzoek kan krampen veroorzaken die lijken op menstruatiepijn. Je mag daarom vooraf een pijnstiller nemen (geen aspirine). Indien je hoge koorts maakt na het onderzoek, raadpleeg dan de gynecoloog of huisarts. Dit komt uiterst zelden voor.

Resultaat

De beelden worden opgeslagen in een computer en geïnterpreteerd door de radioloog. Deze bezorgt de beelden van het onderzoek samen met het verslag aan je gynaecoloog. De resultaten worden besproken tijdens je volgende raadpleging bij je aanvragende arts.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dit wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het is niet mogelijk om alle varianten en alternatieven te vermelden.

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken)

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem

03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek

03 890 16 11

ref.: 50006332

versie: 08/05/2019

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Tim Schokkaert, hoofdverpleegkundige
medische beeldvorming campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

