

Urologie

# Mitomycine



az Rivierenland

# Beste patient,

## Wat is Mitomycine?

Mitomycine is een stof met een celdodend effect op tumoren. Mitomycine kan dus beschouwd worden als een vorm van chemotherapie. Door het product rechtstreeks in de blaas te brengen, wordt de kans op nieuwe blaaspoliepen verkleind.

## De blaasinstillatie

Vóór elke toediening (instillatie) van Mitomycine vraagt de verpleegkundige of je bijwerkingen hebt ondervonden tijdens of na de vorige instillatie. Daarna verwijder je de onderkleding en neem je plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige zal je sonderen en de blaas volledig leegmaken. Daarna dient de verpleegkundige de Mitomycine toe via diezelfde sonde. Vervolgens wordt de sonde verwijderd.

Tijdens het sonderen plaatst de verpleegkundige een sonde doorheen het plaskanaal tot in de blaas. Deze handeling is niet echt pijnlijk, maar sommige mensen ervaren dit wel als onaangenaam.

## Na de blaasinstillatie

Voor een maximaal effect dient het product gedurende één uur in de blaas te blijven. Je dient gedurende deze 60 minuten om het kwartier van houding te veranderen: 15 minuten op de linkerzijde, 15 minuten op de rechterzijde, 15 minuten in ruglig en 15 minuten in buiklig. Hierdoor kan het product overal in de blaas inwerken. Na afloop mag je op het toilet het product uitplassen.

Na de toediening mag je onmiddellijk naar huis om daar een uur op jouw bed te gaan liggen of we reserveren een bed voor je in het dagziekenhuis, zodat je daar een uur kan neerliggen.

## Aanbevelingen

Omdat Mitomycine een toxische stof is, moet je volgende aanbevelingen opvolgen:

- Plas steeds zittend.
- Sluit na het plassen steeds het deksel van het toilet en spoel tweemaal door.
- Was na elke plasbeurt jouw handen en geslachtsdelen met water en zeep. Doe dit tot 8 uur na het uitplassen van het product.
- Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet.
- Reinig het sanitair éénmaal per dag met verdund chloorwater.
- Drink veel na het uitplassen van het product om eventuele irritatie van de blaas zoveel mogelijk te beperken.
- Na de toediening van Mitomycine is de urine blauw-paars van kleur: je hoeft je daar geen zorgen over te maken.

Volg deze richtlijnen tot 48 uur na de blaasinstillatie.

## Blaasinstillatie en seksualiteit

We adviseren om tot 48 uur na de instillatie geen seksuele betrekkingen te hebben. Tot één week na de behandeling moeten jij of jouw partner een condoom gebruiken.

## Hoe vaak vinden blaasinstillaties plaats?

Blaasinstillaties zijn het meest doeltreffend wanneer ze volgens een welbepaald schema plaatsvinden. We starten met wekelijkse instillaties en nadien gaan we verder met maandelijks instillaties. Tijdens de behandelperiode onderga je regelmatig een controleblaasonderzoek (cystoscopie).

## Tot slot

Voor vragen of problemen kan je steeds contact opnemen met de urologen of met de verpleegkundigen van de raadpleging urologie via 03 880 91 87. Voor dringende problemen kan je je aanmelden op de dienst spoedgevallen (03 880 95 20).

# Mijn notities/vragen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ref.: 50120971

versie: 19/04/2024

eigenaar: dr. Evelyne Beckers, uroloog

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

[www.azrivierenland.be](http://www.azrivierenland.be) | [info@azr.be](mailto:info@azr.be)

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172, 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

**CAMPUS RUMST**

's Herenbaan 172

2840 Rumst

03 880 90 11