

IBD (inflammatoire darmziekten) | reumatologie

Een behandeling met Tofacitinib (Xeljanz®)



Wat is Tofacitinib? Opvolging

Tofacitinib (Xeljanz) is een krachtige remmer van bepaalde eiwitten (JAK 1 en JAK 3), die zich in de cellen van ons immuunsysteem bevinden. Tofacitinib remt de ontsteking in de immuuncel en hierdoor zal de ontsteking in de darm afnemen.

Opstart

Vooraleer een behandeling met Tofacitinib kan worden opgestart, screenen we eerst op (in) actieve tuberculose. Deze screening gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en een bloedafname. Daarnaast zal jouw arts samen met je jouw vaccinatie-status nakijken.

Dosis

Tofacitinib wordt oraal ingenomen onder de vorm van 2 tabletten per dag. Tofacitinib mag gecombineerd worden met aminosalicylaten of met een lage dosis corticosteroiden. Tofacitinib mag niet gecombineerd worden met andere medicatie die de afweer kan onderdrukken.

IBD: de aanbevolen dosering is 10 mg 2x / dag gedurende 8 weken, nadien 5 mg 2x / dag als onderhoudsdosis. De dosis van 10 mg 2x / dag kan verlengd worden tot 16 weken indien onvoldoende respons. In geval van een ziekte-opstoot kan de dosis tijdelijk verhoogd worden naar 10 mg 2x / dag.

REUMATO: de dosis bedraagt 5 mg 2*/d.

We plannen een klinische controle na 4, 8 en 16 weken. IBD: we voorzien een eerste endoscopische controle na 8 weken. Bij eventueel onvoldoende effect zal de endoscopie herhaald worden na 16 weken.

Mogelijke bijwerkingen

De meest gemelde - maar tijdelijke nevenwerkingen - bij start van de medicatie zijn hoofdpijn, misselijkheid en gewrichtspijnen.

Tofacitinib kan de weerstand verminderen. Hierdoor heb je meer kans op infecties. De meest voorkomende infecties zijn infecties van de bovenste luchtwegen. Daarnaast is er ook een verhoogde kans op het ontstaan van zona of gordelroos. Bij koorts of tekenen van infecties moet je steeds een arts raadplegen en moet - in overleg met jouw behandelend arts - de inname van Tofacitinib tijdelijk worden gestopt.

Bij start van de medicatie kunnen de cholesterol en/of het creatine kinase (= spierenzyme) in het bloed licht stijgen. Dit is niet zo erg; rode bloedcellen en witte bloedcellen kunnen soms dalen.

Bij patiënten die eerder behandeld werden met Azathioprine is er licht verhoogd risico op non-melanoma huidkanker.

Laat veranderingen van vlekken of zwellingen op de huid nakijken door een dermatoloog. Momenteel lijkt er geen verhoogd risico te zijn op andere vormen van kanker bij gebruik van Tofacitinib.

Zwangerschap en borstvoeding

Tofacitinib mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding. Bespreek een zwangerschapswens tijdig met jouw arts, zodat de medicatie in overleg met jouw arts kan gestopt worden.

Belangrijk!

Gebruik jouw medicatie correct, zoals voorgeschreven door jouw behandelend arts. Jouw huisarts kan geen Tofacitinib voorschrijven.

Tofacitinib moet **steeds op hetzelfde moment van de dag genomen worden**, met of zonder voeding. Bij slikproblemen mogen de tabletten geplet worden. Als je een tablet vergeet, mag je daarna nooit een dubbele dosis nemen, maar moet u de volgende dosis nemen op het gebruikelijke moment.

Start nooit op eigen initiatief een behandeling met hoge dosis corticosteroïden als je behandeld wordt met Tofacitinib.

Bewaar Tofacitinib op **kamertemperatuur** en **buiten bereik van kinderen**.

Verwittig bij ongemakken, bij koorts of tekenen van infectie de IBD-verpleegkundige of arts.

Contact

IBD-artsen

Campus Bornem en Willebroek:

dr. P. Potvin | dr. M. Schils |
dr. G. Van den Steen

Campus Rumst

dr. H. Couckuyt | dr. L. Marchal

Reumatoloog

Campus Bornem en Willebroek:

dr. B. Vander Cruyssen

IBD-verpleegkundig consulente

Campus Bornem

Veroniek Vandewalle
03 890 59 27 | route 40
veroniek.vandewalle@azr.be

Heb je nog vragen?

Campus Bornem: neem contact op met onze IBD-verpleegkundig consulente Veroniek Vandewalle: 03 890 59 27 | route 40
veroniek.vandewalle@azr.be

**IBD-CENTRUM
CAMPUS BORNEM**

dr. P. Potvin -
dr. M. Schils - dr. G. Van den Steen
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

**IBD-CENTRUM
CAMPUS RUMST**

dr. H. Couckuyt - dr. L. Marchal
's Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11

ref.: 50006424 (B) - 50121137 (R)

versie: 28/06/2022

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. P. Potvin, diensthoofd maag, darm en leverziekten
& Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente
v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

