

Vaatheekunde

# Vernauwing van de bloedvaten van de darmen





## Wat zijn slagaders?


Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft om goed te kunnen werken. Het bloed stroomt vanuit het hart via de slagaders door de haarvaten naar de aders. Buikorganen zoals maag en darmen krijgen bloed via 3 slagaders (de maag-/leverslagader, de bovenste darmslagader en de onderste darmslagader).

Deze 3 slagaders zijn zijtakken van de grote buikslagader. Ze zijn onderling met elkaar verbonden.

## Wat zijn de symptomen?

Een vernauwing van 1 slagader heeft meestal weinig invloed op de doorbloeding van het spijsverteringsstelsel. Maar als meerdere van deze slagaders gelijktijdig vernauwd zijn, komt de doorbloeding wel in het gedrang. Door het zuurstoftekort in de buik krijgen patiënten buikpijn na de maaltijd.

In het begin voel je buikpijn na een grote maaltijd, maar nadien ook na kleinere. De pijn doet zich voor nabij de maag en kan uitstralen naar de rug. Door de pijn durft men niet meer te eten en verliest men gewicht.



## Wat zijn de oorzaken?

Slagaderverkalking, dissectie van de grote buikslagader, embolus vanuit het hart of de grote buikslagader, uitwendige druk door een bindweefsel streng van het middenrif.

## Hoe wordt je onderzocht?

De diagnose wordt gesteld via een **duplex-onderzoek** (echobeelden van de bloedvaten) of **angiografie** (röntgenfoto's van de bloedvaten, meestal een angio-CT scan).

## De behandeling

Het doel van de behandeling is het zuurstoftekort oplossen door de vernauwing of verstopping te verhelpen. Er zijn meerdere mogelijkheden. De keuze hangt af van de oorzaak en de medische toestand van de patiënt.

### Endovasculaire behandeling

De vernauwde slagader door slagaderverkalking wordt opengedrukt met een stent die ingebracht wordt via de lies- of armslagader. In geval van een dissectie van de grote buikslagader zal de dissectie behandeld dienen te worden om de buikorganen van voldoende bloed te voorzien. Een embolus in de slagaders van de buikorganen kan meestal endovasculair verwijderd worden.

### Open behandeling

Als een endovasculaire behandeling niet mogelijk is, moet het zuurstoftekort aangepakt worden door het aanleggen van een overbrugging of het verwijderen van het embolus. Deze ingreep wordt uitgevoerd onder volledige verdoving. De buik wordt geopend om de afgesloten slagader te bereiken en de overbrugging aan te leggen of het embolus te verwijderen. De overbrugging wordt gemaakt van een ader uit het been of met kunststof.

### Laparoscopische behandeling

Indien de symptomen worden veroorzaakt door uitwendige druk kan het bindweefsel streng doorgenomen worden met een kijkoperatie.

### Controle van de risicofactoren voor slagaderverkalking

Tijdens de behandeling wordt een gezonde leefstijl gepromoot met gezonde voeding en een verantwoord lichaamsgewicht. Roken is sowieso uit den boze!

Voor meer informatie over de verschillende ingrepen kan je terecht op de consultatie of op [www.dokterbalduyck.be](http://www.dokterbalduyck.be).

### consultatie Bornem

AZ Rivierenland  
Kasteelstraat 23  
2880 Bornem  
tel. voor afspraak: 03 890 16 10

### consultatie Mechelen

Hooiendonkstraat 4  
2801 Heffen (Mechelen)  
tel. voor afspraak: 03 304 60 46

### consultatie Willebroek

Decock kliniek  
Schoolweg 26  
2830 Willebroek  
tel. voor afspraak: 03 304 60 46

### consultatie Bazel

Kruibekestraat 75  
9150 Bazel  
tel. voor afspraak: 03 304 60 46

**ref.: 50006455 (B)**

versie: 15/03/2021

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. Bram Balduyck, vaat- en thoraxchirurg

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

[www.azrivierenland.be](http://www.azrivierenland.be) | [info@azr.be](mailto:info@azr.be)

